

## D.D. de la T.V. por medio del eco-doppler. D.D. de la T.V. con otras patologías

**M. Vila**  
Zaragoza

Regiones con mayor patología:

- Huevo poplíteo
- Pierna en su tercio distal

### ***Cara posterior***

- Huevo poplíteo
  - Gemelo-semimembranoso-bolsas
  - Vasos poplíteos
  - Otras estructuras: LCP, meniscos, etc...
- Pierna
  - Tercio proximal
  - Tercio medio
  - Tercio distal
- Unión musculoesquelética aquilea

### ***Cara posterior: patología***

- Quistes poplíteos: quiste de Baker
- Complicaciones
- Patología asociada:
  - inflamación del TCS
  - rotura meniscal

- Derrames serosos
- Patología vascular

### ***Quiste de Baker: características***

- Morfología:
  - ovoidea en forma de "boomerang" o "boina vasca"
  - límites redondeados
  - ecogenicidad : anecoico o ecogénico
  - engrosamiento de la sinovial
  - ausencia de flujo con el Doppler
- Complicaciones: Rotura del quiste
  - afilamiento del cabo distal
  - colección líquida en planos declives

### ***Patología traumática***

- Contusiones: derrame seroso de Morel-Lavalle
- Roturas de las fascias
- Hernias musculares
- Roturas musculares
  - Elongación
  - Rotura parcial
  - Rotura total-desinserción
- Grupos musculares
  - Gemelos ( interno en el 99 %, y en el tercio distal)
  - Sóleo
- Unión músculotendinosa Aquilea

### ***Diagnóstico diferencial***

- A nivel del hueso poplíteo con un Baker.
- En el tercio distal de la pierna con una rotura fibrilar o con una colección líquida.
- En todas ausencia de señal con el Doppler.