

La discapacidad en España

Antonio Abellán

Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas

El número total de personas con discapacidades en España es 3.528.221, un 9% de la población (1999). La mayor parte de ellas corresponde a mujeres (2.055.251, un 58%; 1.472.970 varones). La cifra de personas de 65 y más años con discapacidades es 2.072.652, un 32,2% de la población de ese grupo de edad. Son los primeros resultados de la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y presentados en enero de 2001.


El concepto de discapacidad se centra en la idea de la deficiencia como único posible origen de la discapacidad¹, es decir, trata de analizar si la persona es capaz de realizar una determinada actividad, independientemente de si realmente la practica o no. Así muchos varones de generaciones anteriores no saben realizar tareas del hogar (nunca lo han hecho), sin embargo no se les considera discapacitados. Se considera que una persona padece una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas (muletas, silla de ruedas, etc.). Si se supera con el uso de gafas no se considera discapacidad salvo que subsista el problema. Una misma persona puede padecer dos o más discapacidades

Existe una gradación importante en las tasas de discapacidad según la edad (Figuras 1 y 2): los varones presentan tasas superiores a las mujeres en la

¹El INE sigue la clasificación CIDMM-I, de la Organización Mundial de la Salud (*Rev Mult Gerontol* 2000; 10(3):189-92). Define discapacidad como la consecuencia de las deficiencias desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo; las discapacidades representan trastornos a nivel de la persona. Las deficiencias hacen referencia a las anomalías de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema cualquiera que sea su causa.


Correspondencia:
Antonio Abellán
CSIC
C/ Pinar, 25
28006 Madrid
E-mail:
abellan@ieg.csic.es

Figura 1.
Personas con discapacidad según edad y sexo.
España, 1999




Fuente: INE: Revisión de las proyecciones de población en base al Censo de población de 1991, a 15 de mayo de 1999. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999. Avance de resultados.

Figura 2.
Personas con discapacidad y tasa según grupo de edad. España, 1999



Fuente: INE: Revisión de las proyecciones de población en base al Censo de población de 1991, a 15 de mayo de 1999. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999. Avance de resultados.

Figura 3.
Personas con discapacidad según el tipo de discapacidad y la edad. España, 1999



Fuente: INE: Revisión de las proyecciones de población en base al Censo de población de 1991, a 15 de mayo de 1999. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999. Avance de resultados.

Nota: una misma persona puede estar en más de una categoría


juventud y edad adulta hasta llegar al umbral de los 45 años. A partir de este momento, las mujeres superan en discapacidades a los varones. En cifras absolutas, existen 1.338.843 mujeres de edad con discapacidad y 733.809 varones, pero también hay más mujeres que varones en esas edades, como consecuencia de una mortalidad masculina más alta.

Las discapacidades (36 tipos) se han reunido en 10 grupos (Figura 3). Hay diferencias notables por edad. En conjunto, los mayores tienen más discapacidades de todos los tipos, pero destacan las de movilidad (desplazarse fuera del hogar, 210 por mil tienen dificultades; desplazarse, 110 por mil), y realizar tareas del hogar (153 por mil). Entre la población más joven, el orden de los tipos de discapacidad es similar, pero con una intensidad entre 7 y 12 veces más baja.

Un rápido repaso por las causas de las deficiencias que motivan las discapacidades, dibuja un perfil diferente para los mayores y el resto de la población (Figura 4). El origen perinatal de las deficiencias mentales es claro en niños, jóvenes y adultos; no es entre mayores, por la influencia de otros factores en ese tipo de discapacidad (como la enfermedad) y porque muchos individuos con deficiencia mental perinatal no han alcanzado las edades superiores, dando así más peso relativo al resto de causas.

Las enfermedades crónicas y degenerativas ocasionan la mayor parte de las deficiencias de las personas de edad (mentales, visuales, auditivas, osteoarticulares). Por eso, un aumento de las tasas de morbilidad, como se ha producido en los últimos años, puede ser indi-

Figura 4.
Algunas deficiencias según las principales causas que las originaron. España, 1999



Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999. Avance de resultados.

cadore de mayores trastornos y situaciones de discapacidad y dependencia futuras. El avance de la medicina hace progresos en el tratamiento de la enfermedad y alarga la vida, pero no devuelve a veces el funcionamiento ni las habilidades perdidas.

Entre los mayores, la principal causa de las deficiencias osteoarticulares procede de enfermedad común (70,5%) y apenas por accidentes laborales, de tráfico o domésticos, con ser éstos importantes (5,2%)². Entre la población más joven, las deficiencias osteoarticulares proceden de enfermedades (53,7%) y de accidentes laborales (10,6%), de tráfico (5,3%) y otras causas.

²Los accidentes domésticos, laborales y de tráfico, en este orden, son causa de deficiencias entre las personas de edad; los accidentes laborales, de tráfico, domésticos y de ocio tienen más importancia en la población de 6-64 años.

La encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999

Ha sido una operación estadística de gran envergadura, llevada a cabo por el INE, con la financiación del IMSERSO y Fundación ONCE.

Objetivos

- Estimar el total de personas que padecen discapacidad y cuáles son éstas,
- conocer el grado de gravedad de los distintos tipos de deficiencias,
- conocer las causas de las deficiencias,
- estimar las personas en desventaja social y con su entorno por sufrir deficiencia,
- conocer la estructura de la población con discapacidad, sus necesidades y los factores de riesgo,
- determinar las diferencias socio-sanitarias entre los que padecen discapacidad y el resto de la población,
- identificar factores de riesgo que inciden en el estado de salud, investigando determinados hábitos de vida,
- atender demandas de información estadística nacionales e internacionales.

Ámbitos de la encuesta

Población residente en viviendas familiares (excluyendo residencias, hospitales, etc.); todas las provincias (y Ceuta y Melilla) españolas; recogida de la información en el segundo trimestre de 1999.

Concepto

Se sigue la CIDDM-1 (véase texto y Barómetro nº 3, 2000). Discapacidad es toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a afectar durante más de un año a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia.

Muestra

79.000 viviendas, en 3.000 secciones censales.

Fases

- 1ª Entrevista a todas las personas del hogar (cuestionario hogar, 11 bloques de preguntas) para captar a los que padezcan discapacidad, y también información del hogar.
- 2ª Entrevista a los que padecen discapacidad (cuestionario a personas de 6 y más años, 10 bloques, y cuestionario para menores de 6 años, 8 bloques).
- 3ª Entrevista a un solo miembro del hogar, seleccionado aleatoriamente, sobre temas de salud (autovaloración, servicios sanitarios, hábitos, accesibilidad, etc.) (cuestionario de salud, 11 bloques).