

Rincón de la imagen

José M^a Carnero Elías. Podólogo
jmcarnero@telefonica.net



Celulitis

La celulitis suele ser causada por la infección bacteriana de una herida o zona de la piel que sufrió alguna lesión. Las causas bacterianas de celulitis más comunes incluyen:

- Grupo A β - estreptococo hemolítico;
- *Streptococcus pneumoniae*;
- *Staphylococcus aureus*;

Otras causas pueden incluir mordeduras humanas o de animales, o heridas que se produzcan en el agua.



Lesión traumática

Lesión traumática con pérdida de sustancia ósea del calcáneo.

Se tuvo que realizar injerto de piel y tejido muscular para adecuar el apoyo y posterior confección de soportes plantares.



Calcáneo insuficiente

Un calcáneo insuficiente con un acortamiento del aquiles se nos manifiesta con un antepié ensanchado y prensil.



Los gangliones

Los gangliones son pequeñas tumoraciones benignas que aparecen más frecuentemente en el dorso del pie, aunque también pueden formarse alrededor del tobillo.

Se forman por la degeneración de los tejidos que cubren las articulaciones y/o los tendones. Estos se van llenando de un

líquido espeso y gelatinoso lo cual hace que se vayan inflando.

Los gangliones por si mismos no duelen, a menos que afecten algún nervio.

Por lo general las molestias son provocadas por la compresión del calzado sobre la tumoración.